

化療副作用

化療一般的副作用會減低血液中的紅血球、白血球或血小板數目，病人會容易受感染或疲倦。



其他常見的副作用包括噁心、嘔吐、脫髮、便秘、腹瀉、口腔潰爛、皮膚痕癢脫皮、神經痺痛肌肉麻痺和生育能力下降。

標靶治療副作用

常見的副作用有腹瀉、皮疹、搔癢、皮膚乾燥、粉刺、甲溝炎、口腔炎和肺炎。



免疫治療副作用

常見的副作用與標靶類似，不常見的副作用有免疫介導性肺炎、肝炎、腎炎、或內分泌疾病(甲狀腺異常)。



電話：(852) 22003193

傳真：(852) 2711 6747

網頁： www.sth.org.hk

電郵： oncology@sth.org.hk

- 私家車: 本院設有「八達通」時租泊車服務
- 綠色專線小巴：2, 2A, 17M, 25M, 46, 70
- 紅色非專線小巴: 旺角往新蒲崗/黃大仙
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 40, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296c
- 港鐵東鐵線九龍塘 B 出口轉乘綠色專線小巴 25M
- 港鐵太子站 B2 出口轉乘綠色專線小巴 17M
- 復康巴士電召服務：(852) 2817 8154

2019年6月修訂


PFE-ONCO-C010



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

腫瘤科中心

抗癌藥物點滴治療



化學治療

化學藥物治療(化療)，是利用抗癌(細胞毒素)的藥物來抑制、消滅癌細胞，並減輕症狀或作輔助性治療。




標靶治療

標靶藥會針對腫瘤細胞的特定異變分子進行攻擊，抑制這些不正常細胞的生長，從而控制病情，減少正常細胞的破壞。



免疫治療

是一種癌症治療的嶄新概念，主要方法是利用藥物來刺激身體免疫系統，對抗癌症。



如何施用藥物？

可採用多種不同的用藥方式，視乎癌症的病理種類和所用的藥物而定。最常見的方法是靜脈注射，皮下注射或口服，本中心大部份病人是使用靜脈注射法。無論採用那種方式，這些藥物都是透過血液輸送到全身，確保藥物能觸及所有癌細胞發揮作用。



靜脈注射法

將抗癌藥物稀釋，透過細管插入靜脈內，靜脈點滴注射需時數分鐘到幾天時間不等。若只需幾小時點滴，可在本中心接受治療。



接受藥物點滴治療過程是怎樣？

1. 治療前醫生約見病人及其家屬，並解釋整個治療過程。
2. 接受治療過程中，可由親友陪同，以作支持。
3. 治療前病人會被安排血液及小便檢驗。
4. 病人/家屬須要簽署「化療/標靶/免疫藥物治療同意書」以示同意接受療程，和明瞭其相關藥物的效益和副作用
5. 因應個別病人的情況來處方合適的藥物及份量。
6. 病人/家屬需到藥房繳交藥物費用和領取所有藥物後返回中心。化療藥物則由本中心職員到藥房領取。
7. 當藥物預備好後，便可開始點滴治療。
8. 每次治療前和後，病人的生命表徵(體溫、血壓、脈搏及血氧)將會監察和記錄，作為評估她/他的狀況。



點滴治療後跟進

病人需按時覆診和相關檢驗，以便醫生跟進療效。

如果病人有任何不適，請於辦公時間聯絡本中心護士，或於非辦公時間可以直接聯絡主診醫生，無需等到預約日期才覆診。



(以上資料只供參考)