

## 本中心其他服务包括:

- ※ 幼针管抽取活组织检验
- ※ 俯卧式乳房立体定位组织穿刺检查
- ※ 乳房脓疮切开及引流手术
- ※ 乳房肿瘤切除手术
- ※ 保留乳房治疗术
- ※ 改良根治性乳房切除手术
- ※ 前哨淋巴结活检术
- ※ 腋下淋巴切除手术
- ※ 化学治疗、标靶治疗

参考数据: [www.21.ha.org.hk/smartpatient](http://www.21.ha.org.hk/smartpatient)

生效日期: 二零二二年三月

PFE-EPI-1-S010



电话: (852) 22003434

网址: [www.sth.org.hk](http://www.sth.org.hk)

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
  - ※乐富:可换乘的士约五分钟到达
  - ※旺角:可换乘非专线小巴至露明道口
  - ※宋皇台:B1 出口,可步行 5-10 分到达
- 东铁
  - ※旺东可换乘的士约五分钟到达
  - ※九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital  
聖德肋撒醫院

## 乳房组织穿刺检查

### Breast Tru-cut Biopsy

### Examination Information

### 程序简介



## 乳房组织穿刺检查



### 乳腺诊断治疗中心

圣德肋撒医院 北座一楼

电话: (852) 2200 3310

办公时间: 09:00-19:00 (星期一至星期六)

### 简介

乳房组织穿刺检查是利用穿刺针在局部麻醉下抽取乳房肿瘤样本作活组织化验。

### 检查前准备

- 需签署手术同意书
- 依指示停药薄血药，避免服用容易导致出血的中药
- 检查前须禁食 4-6 小时或遵医嘱指示
- 宜穿着宽松的衣服，不适宜穿着连身衣服

### 检查过程

- 检查在局部麻醉下进行
- 医生会在抽取组织位置的皮肤注射局部麻醉药，然后利用小刀在皮肤上作一小切口
- 经切口放入穿刺针抽取样本作活组织化验
- 一般抽取三至四个样本
- 伤口需按压五分钟止血，然后敷上压力敷料

### 检查后须知

- 首 24 小时伤口敷上压力敷料作加压止血
- 首 24 小时只可抹身，应保持伤口干爽
- 24 小时后可自行除去压力敷料，保留防水胶布
- 伤口一般于检查后 2 至 3 天愈合，届时可自行除去防水胶布
- 伤口部位出现瘀青属常见现象，此情况一般于检查后 7 至 10 天逐渐消失
- 如伤口疼痛，请依照医生处方服食止痛药

### 麻醉并发症

- 即使属罕有情况，但局部麻醉药有可能导致严重并发症

### 检查并发症

- 伤口疼痛或受感染
- 穿刺部位出血或积聚瘀血
- 抽取组织不足或位置偏差，需再次接受检查

\* 如有查询，请与你的医生联络

圣德肋撒医院，太子道 327 号

電話: (852)-22003434

網址: [www.sth.org.hk](http://www.sth.org.hk)