

本中心其他服务包括

- 幼针管抽取活组织检验
- 乳房组织穿刺检查
- 俯卧式乳房立体定位组织穿刺检查
- 乳房肿瘤切除手术
- 保留乳房治疗术
- 改良根治性乳房切除手术
- 前哨淋巴结活检术
- 腋下淋巴切除手术
- 化学治疗、标靶治疗
- 本中心另设有多项乳房检查或治疗服务，详情请查看本院网站

参考数据: www.21.ha.org.hk/smartpatient

生效日期: 二零二二年三月

PFE-EPI-1-S011



电话: (852) 22003434

网址: www.sth.org.hk

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154




St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

乳房脓疮切开 及引流手术

Examination Information

程序简介



乳房脓疮切开及引流手术



乳腺诊断治疗中心

圣德肋撒医院 北座一楼

电话: (852) 2200 3310

办公时间: 09:00-19:00 (星期一至星期六)

简介

乳房脓肿是脓液积聚于乳腺组织内引起的急性炎症和感染，常见于分娩后哺乳期的乳房。其主要症状包括发红，发热，炎症，肿胀，硬化，压痛和疼痛。如不及时治疗，皮肤会变暗，最终脓肿破裂。

术前准备

- 需签署手术同意书

- 请告知医生任何药物过敏史，常规药物治疗或病况
- 依指示停药薄血药，避免服用容易导致出血的中药
- 请依指示入院
- 手术前须禁食六小时
- 手术前须排尿清空膀胱
- 入院前请洗掉指甲油、脱下饰物及假牙
- 可能需要注射或口服抗生素预防

手术过程

- 手术在局部麻醉情况下进行
- 手术过程大概半小时
- 利用刀片在脓肿皮肤上切割，进入脓腔，让脓液排出，并用纱布吸收脓液和血液
- 使用合适纱布条，填补脓腔
- 用纱布敷料覆盖伤口

术后护理

- 切勿除去伤口上面纱布
- 可照常沐浴但应要保持伤口干爽

- 一般情况下伤口需要每天清洗及更换敷料
- 可照常饮食及活动
- 请依照医生处方服食止痛药

麻醉并发症

- ※ 即使属罕见情况，但局部麻醉药有可能导致严重并发症

手术并发症

- ※ 伤口血肿和感染，但属罕见情况
- ※ 如脓肿范围大，术后可能会造成乳房畸形

* 如有查询，请与本中心或你的医生联络

聖德肋撒醫院, 太子道 327 號

電話: (852)-22003434

網址: www.sth.org.hk