

## 可能出现的并发症:

较严重之并发症包括:

- ◇ 肠道穿孔
- ◇ 出血
- ◇ 心肺并发症
- ◇ 感染及急性肠闭塞等

一般来说机会少于百份之一。

病人如要接受内镜治疗,如息肉切除、内镜止血、扩张及支架放置等则出现严重并发症之机会亦大幅提高。

如并发症出现,病人或需接受外科手术治疗,严重者可导致病人死亡。各并发症发生之机会随着病人不同之情况及治疗方法而有异,病人应主动询问主诊医生以明了详情。

\*以上信息只供参考,并不能完全反映医生意见,如有疑问应咨询你的医生。

Reference: Hospital Authority  
October 2021 (Reviewed)  
PFE-EPI-9-S011




电话: (852) 22003434

网址: [www.sth.org.hk](http://www.sth.org.hk)

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
  - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
  - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
  - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
  - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
  - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital  
聖德肋撒醫院



## 结肠内视镜(大肠镜) 检查

Health Information

健康信息

## 结肠内视镜检查

俗称大肠镜检查,为应用先进光学仪器诊断下腔消化道,包括回肠末端、盲肠、结肠各部位、直肠及肛门疾病的最佳方法。

病人怀疑患有大肠疾病如癌症、出血或大便带隐血、大便习惯改变、长期肚泻或便秘、排便困难等情况均应接受大肠镜检查。

比较传统 X 光检查,大肠镜检查除能更准确发现致病原因,并能同时通过各种辅助仪器,对病源作活钳样本化验及进行治疗。

### 检查过程:

- 1) 医生先给病人注射适量的镇静剂,此能减低病人的焦虑及检查时所引起之不适。
- 2) 医生随着将一支柔软,直径约为 1.5 公分之内视镜由病人肛门放进体内进行检查。

- 3) 视乎病人个别情况,一般来说,整个检查需时约 30 分钟。在一些复杂的个案而需要特别治疗者,所需之时间将会更长。
- 4) 检查期间病人多感到腹部气胀及轻度不适。

### 检查前准备:

- ※ 在检查前,病人必须先服用强力清泻药水以将大肠内之大便全部排出,使医生能更准确地观察大肠壁之病变。如病人未能完成放泻程序,即清泻药或水份不足,则有碍检查进行,如服用过量,则会引致电解质物不平衡,呕吐,肚痛或有水肿情况出现。因此请依照医护人员指示完成药物疗程。

- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血压或怀孕等,须告诉医护人员并听从其指示服药。
- ※ 病人亦应提供现在所服用的药物及任何过敏反应资料。
- ※ 门诊病人不宜亲自驾驶前来;亦应避免在检查前酗酒、抽烟或服用不当份量的镇静药物。年老、行动不便等病人宜由家人陪伴。

### 检查后注意事项:

- ※ 病人接受镇静剂注射后会有头晕感觉,应卧床休息,待药力过后才可起床走动进食;并整天不可操作重型机器或驾驶,以防意外发生。
- ※ 病人应主动查询检查结果及日后覆诊日期,并依照医护人员指示完成药物疗程。

.....