

可能出现的并发症:

其实支气管超声波内镜检查是一个安全的检查,在检查过程中可能引起的并发症:

- ◇ 轻微气胸(1%,可自行消失)
- ◇ 轻微咳血
- ◇ 轻微发烧或纵膈发炎(少于1%)
- ◇ 严重气胸(0.5%,需要引流治疗)
- ◇ 严重咳血(0.2%)
- ◇ 死亡危机,少于0.1%

如有心肺功能不良、高龄、肾衰竭等病者,危险会增加。

*以上信息只供参考,并不能完全反映医生意见,如有疑问应咨询你的医生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-S015



- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富:可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角:可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台:B1 出口,可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

支气管超声波内视镜 检查

Health Information

健康信息

引言:

支气管超声波内视镜检查为应用先进内视镜仪器诊断及治疗胸肺疾病的常见方法，检查的原因包括：纵隔肿块或淋巴结、肺癌的分期及原因不明的呼吸系统病，但支气管镜检查找不出原因。

检查过程:

- 1) 病人喉部先被喷上局部麻醉药，然后注射适量的镇静剂。
- 2) 医生会用一条约六毫米粗的软管从病人的口腔，经过咽喉进入气管，直接观察及检查气管及支气管。
- 3) 医护人员会严密观察你的生命体征、血压、脉搏和血氧饱和量等，有需要时会给予额外氧气。
- 4) 如有需要，医生会按需要而抽取肺部的分泌，进行幼针穿刺或钳取少量气管或肺部组织作进一步化验。

- 5) 检查期间，病人或会咳嗽，此乃正常反应，应尽量放松，如常呼吸，则有助检查顺利进行。
- 6) 一般来说，整个内视镜检查需时 30-60 分钟，在一些复杂的个案，所需之时间将会更长。

检查前准备:

- ※ 作有关的血液化验或肺功能测试。
- ※ 照肺部 X 光片或计算机扫描。
- ※ 病人须于内视镜检查前六小时禁食。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血压或怀孕等，须告诉医护人员并听从其指示服药。
- ※ 病人亦应提供现所服用药物及任何过敏反应资料。

- ※ 门诊病人不宜亲自驾驶前来；应避免在检查前酗酒、抽烟或服用不当份量的镇静药物。年老、行动不便的病人宜由家人陪伴前来检查。

检查后注意事项:

- ※ 因喉部曾接受局部麻醉喷剂，病人检查后尚须禁食两小时，以待喉部麻醉药或镇静剂药力减退后才可进食。
- ※ 病人于检查后，或会接受 X 光检查。
- ※ 检查后会有轻微喉痛、声嘶及痰液有少量血丝。
- ※ 病人接受镇静剂注射后会有头晕感觉，应卧床休息，待药力过后才可起床走动；并整天不可操作重型机器或驾驶，以防意外发生。
- ※ 病人应主动查询检查结果及日后覆诊日期，并依照医护人员指示完成药物疗程。