

可能出现的并发症:

较严重之并发症包括:

- ◇ 肠道穿孔
- ◇ 出血
- ◇ 胰脏发炎 (如需作胰脏幼针穿刺)
- ◇ 心肺并发症及感染等

一般来说机会少于百份之一。各并发症发生之机会随着病人不同之情况、检验及治疗方法而有所差异,病人应主动询问主诊医生以明了详情。如出现并发症,病人或需接受外科手术补救,严重者可导致病人死亡。

*以上信息只供参考,并不能完全反映医生意见,如有疑问应咨询你的医生。

Reference: Hospital Authority
October 2021 (Reviewed)
PFE-EPI-9-S016



- 本院設有「八达通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分鐘到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

超声波内视镜检查

Health Information

健康信息

引言:

超声波内视镜检查，为应用先进内视镜仪器诊断上腔消化道，以及纵隔腔、肝、胆管、胰脏的最佳方法。病人患有上消化道疾病、肝胆胰病变，以及纵隔腔疾病等情况，均应接受超声波内视镜检查。

比较传统X光检查和体外超声波，超声波内视镜检查除能更准确发现致病原因，并能同时通过各种辅助仪器，对病源作幼针穿刺、活钳样本化验及进行治疗。

检查过程:

- 1) 病人喉部先被喷上局部麻醉药，然后注射适量的镇静剂。
- 2) 医生随着将一支柔软，直径约为1.1-1.3公分之超声波内视镜经口部(检查骨盆腔或大肠病者会经肛门)放进病人体内进行检查。

- 3) 一般来说，整个内视镜检查需时约20-30分钟。在一些复杂的个案而需要特别治疗者，所需之时间将会更长。
- 4) 检查期间病人多感到恶心及上腹膨胀不适。

检查前准备:

- ※ 病人须于内视镜检查前六小时禁食。
- ※ 病人如有其他疾病如糖尿病、高血压或怀孕等，须告诉医护人员并听从其指示服药。
- ※ 病人亦应提供现所服用药物及任何过敏反应资料。
- ※ 门诊病人不宜亲自驾驶前来；亦应避免在检查前酗酒、抽烟或服用不当份量的镇静药物。年老、行动不便的病人宜由家人陪伴前来检查。

检查后注意事项:

- ※ 因喉部曾接受局部麻醉喷剂，病人检查后尚须禁食一小时，以待喉部麻醉药或镇静剂药力减退后才可进食。
- ※ 病人接受镇静剂注射后会有头晕感觉，应卧床休息，待药力过后才可起床走动。并整天不可操作重型机器或驾驶，以防意外发生。
- ※ 病人应主动查询检查结果及日后覆诊日期，并依照医护人员指示完成药物疗程。

.....