

圣德肋撒医院

眼科中心

病人须知

白内障手术

手术前

- 患慢性疾病，如高血压、糖尿病、心脏病、对药物敏感等，请通知医生
- 长期服药者，应照常服药
- 若服 Aspirin (亚斯匹灵)或其他薄血药者，请通知医生
- 不须戒口，应食营养丰富及易消化食物，多吃水果、蔬菜，防止便秘
- 不要喝酒、吸烟
- 手术前，要洗干净头发、剪指甲

手术当日

- 长期服药者，请照常服药，但 Aspirin (亚斯匹灵)及薄血药除外
- 洗干净脸部
- 用局部麻醉进行手术，不须禁食，但不要进食太饱
- 不要穿过头衣服，以免碰撞伤口
- 如有假牙，请先除下

請_____由家人陪同於_____月_____日_____午_____時_____分準時到

手术时

- 医生会在眼部施行局部麻醉
- 手术时有知觉但不会痛
- 手术时尽量放松身体，不可随意移动
- 脸部会用消毒布盖着，但会确保空气流通

白内障手术能引发的并发症

手术成功率非常高，但亦有小部份病人于手术后出现以下并发症：

- 如细菌感染，视力可能将会受损
- 青光眼、视网膜脱落、出血、角膜水肿等，但可进一步用药物或手术治疗
- 晶体后囊或有可能续渐变厚，视力便会渐变模糊，在这情况下，可作简单的激光治疗 (YAG LASER) 便能回复视力

参考数据

1. 医院管理局- 智友站 Retrieve, 2012 from

http://www.ekg.org.hk/pilic/public/Ophthal_PILIC/Ophthal_CataractOperationandIntraOcularLensImplantation_0065_chi.pdf