

温馨提示

- ◇ 请提前预约检查。
- ◇ 请携带医生转介信，身份证/护照或有效的香港旅游签证于检查前 15 分钟到本中心登记。
- ◇ 如未能出席，请在办公时间上午 8 时至下午 4 时致电通知本中心。
- ◇ 当黑色暴雨警告生效 / 八号或以上风球悬挂，请联络本中心，以便重新安排检查日期。
- ◇ 另设有多项健康检查计划，详情请查看本院网站。

参考数据：www.21.ha.org.hk/smartpatient

生效日期：二零二二年三月一日

PFE-EPI-3-S014



电话：(852) 22003434

网址：www.sth.org.hk

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线：2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士：1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富：可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角：可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台：B1 出口，可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士：(852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

倾斜床测试

Tilt Table Test

Examination Information

程序简介

倾斜床测试



体检及诊断中心

圣德肋撒医院主楼一楼

电话: (852) 2200 3155

办公时间: 08:00-16:00 (星期一至星期六)

简介

倾斜床测试常用于测试一些曾多次无故昏厥的病人。透过测试可以诊断出如血管迷走神经性晕眩等病因。

测试时透过倾斜床，病人的身体将会维持在倾斜状态，体内静脉血液会因地心吸力而积聚于腿部，而回流至心脏的血液亦相对地减少。在正常的生理状态下体内神经会作出相对的调整，心跳和血压会增加，间接促进血液回流。但患有血管迷走神经性晕眩的病人心跳或血压会不增反减，引致昏厥，检查过程需时 1-2 小时。

检查前准备

1. 禁食四至六小时。
2. 医护人员会解释测试的目的，过程和风险，受检查者明白后需签署同意书。并按医生指示停药需要暂停的药物。
3. 医护人员会为病人置入静脉导管，需要时按医生指示注射药物。
4. 门诊病人请安排亲友陪同。

测试过程

1. 病人首先躺卧在倾斜床上并扣上固定带，接驳监察仪器以便监察心律、血压和血含氧量。
2. 倾斜床会缓缓地被调节至大约倾斜 60-80 度，病人的身体会维持在这个角度大约 30-60 分钟。医护人员会密切观察病人的生命表征。如基本测试呈阴性结果，医护人员会利用药物帮助引发昏厥，再进行余下的 30 分钟测试。
3. 如经过 30 分钟后仍然没有症状，测试结果便是阴性。
4. 测试期间，病人需保持心境平静，以便观察有否晕眩、恶心、出汗或昏厥等状况出现。
5. 过程中如出现以上症状而同时病人的心跳和血压呈现相应的变化，测试结果便是阳性。这时病人会尽快被调校至平卧的位置。直至神智清醒，心跳和血压回复正常，整个测试便完成。

测试后护理

1. 测试将会由医生与护士一同进行监测。
2. 测试后需休息 20-30 分钟，待生命表征回复正常，得到医护人员同意方可离开。
3. 当医护人员确定您的血压及心律回复正常后，您才能离开检查室。

风险

1. 此检查有一定风险。
2. 风险包括暂时性心脏停顿(> 5 秒)。
3. 测试过程所使用的药物可引致心跳紊乱及突发心脏病。

如有任何查询，欢迎致电本中心或与你的医生联络。

圣德肋撒医院，太子道 327 号

电话: (852)-22003434

网址: www.sth.org.hk