



电话: (852) 22003434

网址: www.sth.org.hk

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

发热性痉挛 (抽搐)



健康信息

发热性痉挛(抽搐)

什么是发热性痉挛?

顾名思义,发热性痉挛是指发高烧而引起的抽搐。发生的年纪通常介于六个月到六岁之间。这些小孩的生长发育与身心发展是完全正常的,只有在体温突然间迅速窜升之时 (>38°C)才会引起抽搐,其他时候与常人无异。

热性痉挛在什么情况下会出现?

因感染而引致体温升高,都有机会引起热性痉挛。最常见的的发烧原因,多源于上呼吸道感染、肠胃炎、肺炎、中耳炎或预防注射所致。

热性痉挛的特征:

- 发高烧,而且体温急速上升
- 一般在开始发烧后 24 小时内出现抽搐现象,但亦有在抽搐后才发现有发烧
- 抽搐常在高烧急速上升时出现

- 抽搐时通常有以下表现:
 - ※ 突然失去知觉、没反应
 - ※ 手脚会抽动、僵直、或是突然全身松软无力
 - ※ 目光呆滞或眼睛反白
 - ※ 嘴唇变黑(蓝紫色)
 - ※ 牙关紧闭
 - ※ 痉挛时间,可从数十秒到数分钟,大多少于 15 分钟。
- 良性痉挛 - 确定是发热性痉挛的小孩,大部分 5 岁后就不再发作,预后良好,不会导致死亡、不会引起脑部受创,也没有任何证据显示日后会导致学习障碍。

小孩正在抽搐时应该如何处理?

- 父母须保持冷静,必须立即把小孩身体翻转成侧卧的姿势,以免口腔的分泌物倒流到气管内。
- 不可强行撬开小孩口腔或塞任何物品入口腔,更不要强行约束小孩。
- 此外要保护小孩的头,避免碰撞。
- 在旁边观察并纪录抽搐发作状况及时间,在抽搐结束后,应尽快往见医生或送往医院。如抽搐超过五分钟,应即打 999 叫十字车送往医院处理。
- 如发高烧,可先给予退烧栓塞药。

*以上信息只供参考,并不能完全反映医生意见,想了解更多有关信息,应咨询你的医生。