

风险

- 烧伤, 水泡, 结痂, 瘢痕
- 短暂性神经发炎引致局部肌肉无力
- 短暂性神经麻痹
- 局部位置表面不平整
- 局部位置感觉改变
- 肿块/结瘤
- 色素变化
- 唇疮(单纯性疱疹)复发机会增加

如有任何关于聚焦超声波治疗的查询, 请与你的医生/医护人员联络。

参考数据:

- 美国食品药品监督管理局 U.S. Food and Drug Administration
- Ulthera@ System Instructions for Use, Ulthera, Inc.

最后更新日期: 01/07/2022

PFE-EPI-5-S016



- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154




St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

聚焦超声波治疗

Ulthera Treatment

皮肤激光及整形外科中心
Skin Laser & Plastic Surgery Centre



聚焦超声波治疗

简介

聚焦超声波 (Ulthera) 是一项非入侵性及实时可以恢复社交活动的治疗。Ulthera 是利用聚焦超声波能量, 绕过表皮肌肤, 精确地直达皮肤肌肉层 1.5mm~4.5mm 深度, 并把能量加热至 65 - 70°C, 激发皮肤底层的更新机制, 刺激深层软组织收缩, 以达至没有伤害肌肤表面组织的情况下提升松弛肌肤。

一般在接受 Ulthera 一次疗程后, 实时已有提升效果, 经过 2 - 6 个月持续进展后, 皮肤紧致及面部轮廓纤修可达高峰。但个别接受治疗者对疗程的反应略有不同, 效果出现之时间及程度均有别。

Ulthera 亦可提供纤修其他身体部位疗程。

禁忌症

以下患者不适宜接受聚焦超声波治疗

1. 已植入起搏器、植入式心脏去纤颤器或任何其他可植入式电子装置。
2. 治疗部位有伤口、增生疤痕、严重暗疮、填充剂或其他植入物。

治疗前准备

在 Ulthera 治疗过程开始前, 医生可能会用止痛药及止痛膏减低不适。

治疗过程

1. 在进行咨询时, 医生会与你讨论是次治疗的期望及问题。
2. 医生/医护人员会解释治疗目的、过程和风险, 明白后需签署同意书。
3. 请卸妆和洗脸。
4. 医护人员会在治疗前拍摄照片作临床之用。
5. 医护人员会询问治疗者的过敏纪录及过往医疗纪录。
6. 当 Ulthera 能量发放至皮肤深层时, 治疗者会感受到短暂的疼痛感觉。治疗者若有不适, 或其他异常感觉, 必须立即告知医生。

治疗后须知

接受 Ulthera 疗程后, 治疗者的治疗部位会有轻微红肿, 治疗后数小时内消散, 不用冰敷。个别会出现短暂红肿、瘀肿和麻痹感觉, 但均在数天内消散。在罕见的情况下, 才会出现较持久的皮肤异常反应, 包括短暂性神经发炎引致局部肌肉无力及短暂性神经麻痹, 大部份均在 3 个月内消散。

治疗后的护理指引

- 可使用温和, 不含药性的润肤膏保护皮肤。
- 可用清水或温和的洁肤用品清洁。
- 尽量避免剧烈运动、晒太阳浴。
- 应避免饮酒。
- 日间及进行户外活动前要涂上防晒膏, 防晒度数最少要有 SPF50 或以上 (防紫外线 B) 及 PA++++或以上 (防紫外线 A)

圣德肋撒医院,
太子道 327 号

电话: (852)-22003434

网址: www.sth.org.hk