



電話: (852) 22003434

網址: www.sth.org.hk



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

大腸鋇劑灌腸造影

Barium Enema

- 本院設有「八達通」時鐘泊車服務
- 綠色專線: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 紅色非專線 旺角往新蒲崗/黃大仙/九龍城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港鐵
 - ※ 樂富: 可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 旺角: 可換乘非專線小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到達
- 東鐵
 - ※ 旺東可換乘的士約五分鐘到達
 - ※ 九龍塘可換乘專線小巴 25M 至界限街
- 復康巴士: (852) 2817 8154

Examination Information

程序簡介

參考資料: 香港醫管局

生效日期: 二零二二年三月一日

PFE-EPI-4-C011

大腸鋇劑灌腸造影



X 光部

聖德肋撒醫院主樓一樓

電話:(852) 2200 3112

辦公時間: 09:00-17:00 (星期一至五)

09:00-13:00 (星期六)

簡介

透過 X 光檢查大腸的病變。

檢查前準備

為確保高質素的檢查效果，檢查前的準備必須嚴格執行

1. 檢查前二天低渣滓飲食(如麵包、薯仔、飯等澱粉質食物。不能吃蔬菜、生果)。
2. 檢查前一天飲流質。
3. 檢查前 8 小時開始禁飲食。
4. 糖尿病人請遵照醫生指示調節糖尿病份量。

5. 潔腸的方法，由主診醫生決定採用下列其中一項：
 - 服用輕瀉劑，例如 Klean Prep 或同等藥物；請依指示服用；或
 - 灌腸清洗
- ※ 檢查前一晚服用輕瀉藥 (Dulcolax) 二粒
- ※ 檢查前三小時，開始灌洗大腸，必須徹底清除腸內的糞便
6. 洗腸後，要等一至二小時讓腸道內的水份被充份吸收，才可以進行灌腸造影檢查。
7. 如懷疑可能或已經懷孕，檢查前請先通知放射科職員。

檢查過程

1. 這項檢查是由放射醫生執行，需時約一小時。
2. 利用 X 光透視，放射科醫生將鋇劑和空氣注入導管經肛門、直腸直達大腸，同時進行觀察及 X 光攝影。
3. 注入空氣和鋇劑，會引起腹部脹痛不適，然而檢查完成後，不適感便會消失。
4. 當檢查進行時，病人如感覺腹部疼痛或任何不適，應立即通知醫生。

5. 檢查進行時，病人請與醫生及放射技師合作，身體依指示作不同角度的轉動，以配合拍攝大腸各部份
6. 如有需要，醫生會替病人注射藥物來放鬆大腸。

護理和建議

1. 檢查完畢後，病人可以如常進食。
2. 檢查後數天內，大便可能呈現白色。
3. 檢查後儘量飲大量開水。

可能發生的併發症

併發症發生率極微

- ※ 病人腸壁如因近期手術而有輕微破損，鋇劑造影檢查可能導致大腸穿孔。
- ※ 鋇劑可能滲入靜脈血管內。

聖德肋撒醫院,

太子道 327 號

電話: (852)-22003434

網址: www.sth.org.hk