



电话: (852) 22003434

网址: www.sth.org.hk



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

大肠钡剂灌肠造影

Barium Enema

- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154

Examination Information

程序简介

参考数据: 香港医管局

生效日期: 二零二二年三月一日

PFE-EPI-4-S011

大肠钡剂灌肠造影



X 光部

圣德肋撒医院主楼一楼

电话: (852) 2200 3112

办公时间: 09:00-17:00 (星期一至五)

09:00-13:00 (星期六)

简介

透过 X 光检查大肠的病变。

检查前准备

为确保高质素的检查效果，检查前的准备必须严格执行

1. 检查前二天低渣滓饮食(如面包、薯仔、饭等淀粉质食物。不能吃蔬菜、生果)。
2. 检查前一天饮流质。
3. 检查前 8 小时开始禁饮食。
4. 糖尿病人请遵照医生指示调节糖尿病药份量。

5. 洁肠的方法，由主诊医生决定采用下列其中一项：
 - 服用轻泻剂，例如 Klean Prep 或同等药物；请依指示服用；或
 - 灌肠清洗
- ※ 检查前一晚服用轻泻药 (Dulcolax) 二粒
- ※ 检查前三小时，开始灌洗大肠，必须彻底清除肠内的粪便
6. 洗肠后，要等一至二小时让肠道内的水份被充份吸收，才可以进行灌肠造影检查。
7. 如怀疑可能或已经怀孕，检查前请先通知放射科职员。

检查过程

1. 这项检查是由放射医生执行，需时约一小时。
2. 利用 X 光透视，放射科医生将钡剂和空气注入导管经肛门、直肠直达大肠，同时进行观察及 X 光摄影。
3. 注入空气和钡剂，会引起腹部胀痛不适，然而检查完成后，不适感便会消失。
4. 当检查进行时，病人如感觉腹部疼痛或任何不适，应立即通知医生。

5. 检查进行时，病人请与医生及放射技师合作，身体依指示作不同角度的转动，以配合拍摄大肠各部份
6. 如有需要，医生会替病人注射药物来放松大肠。

护理和建议

1. 检查完毕后，病人可以如常进食。
2. 检查后数天内，大便可能呈现白色。
3. 检查后尽量饮大量开水。

可能发生的并发症

并发症发生率极微

- ※ 病人肠壁如因近期手术而有轻微破损，钡剂造影检查可能导致大肠穿孔。
- ※ 钡剂可能渗入静脉血管内。

圣德肋撒医院，
太子道 327 号

电话: (852)-22003434

网址: www.sth.org.hk