

化疗副作用

化疗一般的副作用会减低血液中的红血球、白血球或血小板数目，病人会容易受感染或疲倦。



其他常见的副作用包括恶心、呕吐、脱发、便秘、腹泻、口腔溃疡、皮肤痕痒脱皮、神经痹痛肌肉麻痹和生育能力下降。

标靶治疗副作用

常见的副作用有腹泻、皮疹、搔痒、皮肤干燥、粉刺、甲沟炎、口腔炎和肺炎。



免疫治疗副作用

常见的副作用与标靶类似，不常见的副作用有免疫介导性肺炎、肝炎、肾炎、或内分泌疾病(甲状腺异常)。



电话: (852) 22003434

网址: www.sth.org.hk


- 本院设有「八达通」时钟泊车服务
- 绿色专线: 2, 17M, 25M, 46, 70,
- 红色非专线 旺角往新蒲岗/黄大仙/九龙城
- 公共巴士: 1, 1A, 2A, 6D, 7B, 9, 12A, 13D, 16, 24, 27, 42, 95, 98C, 113, 203E, 296C, N216
- 港铁
 - ※ 乐富: 可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 旺角: 可换乘非专线小巴至露明道口
 - ※ 宋皇台: B1 出口, 可步行 5-10 分到达
- 东铁
 - ※ 旺东可换乘的士约五分钟到达
 - ※ 九龙塘可换乘专线小巴 25M 至界限街
- 复康巴士: (852) 2817 8154



St. Teresa's Hospital
聖德肋撒醫院

腫瘤科中心

抗癌药物点滴治疗



化学治疗

化学药物治疗(化疗)，是利用抗癌(细胞毒素)的药物来抑制、消灭癌细胞，并减轻症状或作辅助性治疗。




标靶治疗

标靶药会针对肿瘤细胞的特定变异分子进行攻击，抑制这些不正常细胞的生长，从而控制病情，减少正常细胞的破坏。



免疫治疗

是一种癌症治疗的崭新概念，主要方法是利用药物来刺激身体免疫系统，对抗癌症。



如何施用药物?

可采用多种不同的用药方式，视乎癌症的病理种类和所用的药物而定。最常见的方法是静脉注射，皮下注射或口服，本中心大部份病人是使用静脉注射法。无论采用那种方式，这些药物都是透过血液输送到全身，确保药物能触及所有癌细胞发挥作用。



静脉注射法

将抗癌药物稀释，透过细管插入静脉内，静脉点滴注射需时数分钟到几天时间不等。若只需几小时点滴，可在本中心接受治疗。



电话： (852) 22003193
传真： (852) 2711 6747
网页： www.sth.org.hk
电邮： oncology@sth.org.hk

接受药物点滴治疗过程是怎样?

1. 治疗前医生约见病人及其家属，并解释整个治疗过程。
2. 接受治疗过程中，可由亲友陪同，以作支持。
3. 治疗前病人会被安排血液及小便检验。
4. 病人/家属须要签署「化疗/标靶/免疫药物治疗同意书」以示同意接受疗程，和明瞭其相关药物的效益和副作用
5. 因应个别病人的情况来处方合适的药物及份量。
6. 病人/家属需到药房缴交药物费用和领取所有药物后返回中心。化疗药物则由本中心职员到药房领取。
7. 当药物预备好后，便可开始点滴治疗。
8. 每次治疗前和后，病人的生命表征(体温、血压、脉搏及血氧)将会监察和记录，作为评估她/他的状况。



点滴治疗后跟进

病人需按时覆诊和相关检验，以便医生跟进疗效。

如果病人有任何不适，请于办公时间联络本中心护士，或于非办公时间可以直接联络主诊医生，无需等到预约日期才覆诊。



(以上数据只供参考)